

## Вариант 1

### 1. Выберите признаки интенсивного наружного кровотечения:

- А) одежда, пропитанная кровью;
- Б) скопление значительного количества крови на земле возле пострадавшего;
- В) видимые раны с интенсивно вытекающей из них кровью;
- Г) все варианты верны.

### 2. Какие способы временной остановки наружного кровотечения используются в настоящее время:

- А) пальцевое прижатие артерии;
- Б) прямое давление на рану;
- В) наложение давящей повязки;
- Г) наложение кровоостанавливающего жгута;
- Д) сгибание конечности в суставе;
- Е) все варианты верны.

### 3. При проведении искусственной вентиляции легких для снижения риска заражения человека, оказывающего первую помощь, могут использоваться:

- А) медицинские маски;
- Б) защитные устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;
- В) любая ткань (например, кусок марлевого бинта или одежда);
- Г) все варианты верны.

### 4. Для проверки наличия сознания у пострадавшего необходимо:

- А) громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?»;
- Б) громко хлопнуть в ладоши около ушей пострадавшего;
- В) аккуратно потормошить пострадавшего за плечи;
- Г) надавить на болевые точки у пострадавшего;
- Д) хлопнуть пострадавшего по щекам.

### 5. Что необходимо сделать при частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом? Пострадавший говорит, что он подавился и кашляет.

- А) предложить пострадавшему покашлять;
- Б) встать сбоку и немного сзади пострадавшего, придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперед, нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего;
- В) встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней части живота, сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком большим пальцем к себе, обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху;
- Г) Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его удаления, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на живот.

**6. Заваривая чай, человек вылил кипяток себе на руку. На месте ожога покраснение и отек кожи, появились пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему?**

А) вскрыть ожоговые пузыри;

Б) охладить обожженную часть тела прохладной водой (комнатной температуры) не менее 20 минут;

В) при отсутствии воды ее можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани;

Г) нанести на пораженный участок мазь.

**7. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь необходимо:**

А) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;

Б) вызвать экстренные службы;

В) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего;

Г) позвать помощника.

**8. Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:**

А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет;

Б) запрокинуть голову, попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение его грудной клетки;

В) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки или перышко;

Г) положить руку на грудную клетку пострадавшему.

**9. Частота надавливаний на грудную клетку при СЛР составляет:**

А) 60-80 в минуту;

Б) 40-50 в минуту;

В) 80-90 в минуту;

Г) 100-120 в минуту.

**10. Какое положение лучше придать пострадавшему с подозрением на травму живота и таза?**

А) устойчивое боковое положение;

Б) лежа на спине с приподнятыми ногами, под которые подкладываются сумки или одежда;

В) лежа на спине с полусогнутыми ногами, сведенными в районе коленных и голеностопных суставов. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.

Г) лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.

## Вариант 2

### 1. Выберите признаки интенсивного наружного кровотечения:

- А) одежда, пропитанная кровью;
- Б) скопление значительного количества крови на земле возле пострадавшего;
- В) видимые раны с интенсивно вытекающей из них кровью;
- Г) все варианты верны.

### 2. При проведении искусственной вентиляции легких для снижения риска заражения человека, оказывающего первую помощь, могут использоваться:

- А) медицинские маски;
- Б) защитные устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;
- В) любая ткань (например, кусок марлевого бинта или одежда);
- Г) все варианты верны.

### 3. Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:

- А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет;
- Б) запрокинуть голову, попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение его грудной клетки;
- В) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки или перышко;
- Г) положить руку на грудную клетку пострадавшему.

### 4. Какое положение лучше придать пострадавшему с подозрением на травму живота и таза?

- А) устойчивое боковое положение;
- Б) лежа на спине с приподнятыми ногами, под которые подкладываются сумки или одежда;
- В) лежа на спине с полусогнутыми ногами, сведенными в районе коленных и голеностопных суставов. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.
- Г) лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.

### 5. Что необходимо сделать при частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом? Пострадавший говорит, что он подавился и кашляет.

- А) предложить пострадавшему покашлять;
- Б) встать сбоку и немного сзади пострадавшего, придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперед, нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего;
- В) встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней части живота, сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком большим пальцем к себе, обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху;

Г) Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его удаления, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на живот.

**6. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь необходимо:**

А) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;

Б) вызвать экстренные службы;

В) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего;

Г) позвать помощника.

**7. Заваривая чай, человек вылил кипяток себе на руку. На месте ожога покраснение и отек кожи, появились пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему?**

А) вскрыть ожоговые пузыри;

Б) охладить обожженную часть тела прохладной водой (комнатной температуры) не менее 20 минут;

В) при отсутствии воды ее можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани;

Г) нанести на пораженный участок мазь.

**8. Какие способы временной остановки наружного кровотечения используются в настоящее время:**

А) пальцевое прижатие артерии;

Б) прямое давление на рану;

В) наложение давящей повязки;

Г) наложение кровоостанавливающего жгута;

Д) сгибание конечности в суставе;

Е) все варианты верны.

**9. Частота надавливаний на грудную клетку при СЛР составляет:**

А) 60-80 в минуту;

Б) 40-50 в минуту;

В) 80-90 в минуту;

Г) 100-120 в минуту.

**10. Для проверки наличия сознания у пострадавшего необходимо:**

А) громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?»;

Б) громко хлопнуть в ладоши около ушей пострадавшего;

В) аккуратно потормошить пострадавшего за плечи;

Г) надавить на болевые точки у пострадавшего;

Д) хлопнуть пострадавшего по щекам.

### Вариант 3

**1. Какие способы временной остановки наружного кровотечения используются в настоящее время:**

- А) пальцевое прижатие артерии;
- Б) прямое давление на рану;
- В) наложение давящей повязки;
- Г) наложение кровоостанавливающего жгута;
- Д) сгибание конечности в суставе;
- Е) все варианты верны.

**2. Какое положение лучше придать пострадавшему с подозрением на травму живота и таза?**

- А) устойчивое боковое положение;
- Б) лежа на спине с приподнятыми ногами, под которые подкладываются сумки или одежда;
- В) лежа на спине с полусогнутыми ногами, сведенными в районе коленных и голеностопных суставов. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.
- Г) лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.

**3. Для проверки наличия сознания у пострадавшего необходимо:**

- А) громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?»;
- Б) громко хлопнуть в ладоши около ушей пострадавшего;
- В) аккуратно потормозить пострадавшего за плечи;
- Г) надавить на болевые точки у пострадавшего;
- Д) хлопнуть пострадавшего по щекам.

**4. Что необходимо сделать при частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом? Пострадавший говорит, что он подавился и кашляет.**

- А) предложить пострадавшему покашлять;
- Б) встать сбоку и немного сзади пострадавшего, придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперед, нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего;
- В) встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней части живота, сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком большим пальцем к себе, обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху;
- Г) Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его удаления, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на живот.

**5. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь необходимо:**

- А) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;
- Б) вызвать экстренные службы;

В) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего;

Г) позвать помощника.

**6. Заваривая чай, человек вылил кипяток себе на руку. На месте ожога покраснение и отек кожи, появились пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему?**

А) вскрыть ожоговые пузыри;

Б) охладить обожженную часть тела прохладной водой (комнатной температуры) не менее 20 минут;

В) при отсутствии воды ее можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани;

Г) нанести на пораженный участок мазь.

**7. Выберите признаки интенсивного наружного кровотечения:**

А) одежда, пропитанная кровью;

Б) скопление значительного количества крови на земле возле пострадавшего;

В) видимые раны с интенсивно вытекающей из них кровью;

Г) все варианты верны.

**8. При проведении искусственной вентиляции легких для снижения риска заражения человека, оказывающего первую помощь, могут использоваться:**

А) медицинские маски;

Б) защитные устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;

В) любая ткань (например, кусок марлевого бинта или одежда);

Г) все варианты верны.

**9. Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:**

А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет;

Б) запрокинуть голову, попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение его грудной клетки;

В) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки или перышко;

Г) положить руку на грудную клетку пострадавшему.

**10. Частота надавливаний на грудную клетку при СЛР составляет:**

А) 60-80 в минуту;

Б) 40-50 в минуту;

В) 80-90 в минуту;

Г) 100-120 в минуту.

## Вариант 4

**1. При проведении искусственной вентиляции легких для снижения риска заражения человека, оказывающего первую помощь, могут использоваться:**

- А) медицинские маски;
- Б) защитные устройства для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»;
- В) любая ткань (например, кусок марлевого бинта или одежда);
- Г) все варианты верны.

**2. Какие способы временной остановки наружного кровотечения используются в настоящее время:**

- А) пальцевое прижатие артерии;
- Б) прямое давление на рану;
- В) наложение давящей повязки;
- Г) наложение кровоостанавливающего жгута;
- Д) сгибание конечности в суставе;
- Е) все варианты верны.

**3. Частота надавливаний на грудную клетку при СЛР составляет:**

- А) 60-80 в минуту;
- Б) 40-50 в минуту;
- В) 80-90 в минуту;
- Г) 100-120 в минуту.

**4. Что необходимо сделать при частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом? Пострадавший говорит, что он подавился и кашляет.**

- А) предложить пострадавшему покашлять;
- Б) встать сбоку и немного сзади пострадавшего, придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперед, нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками пострадавшего;
- В) встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на уровне верхней части живота, сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком большим пальцем к себе, обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего вперед, резко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху;
- Г) Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его удаления, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на живот.

**5. Для проверки наличия сознания у пострадавшего необходимо:**

- А) громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?»;
- Б) громко похлопать в ладоши около ушей пострадавшего;
- В) аккуратно потормошить пострадавшего за плечи;
- Г) надавить на болевые точки у пострадавшего;
- Д) похлопать пострадавшего по щекам.

**6. Выберите признаки интенсивного наружного кровотечения:**

- А) одежда, пропитанная кровью;
- Б) скопление значительного количества крови на земле возле пострадавшего;
- В) видимые раны с интенсивно вытекающей из них кровью;
- Г) все варианты верны.

**7. Заваривая чай, человек вылил кипяток себе на руку. На месте ожога покраснение и отек кожи, появились пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему?**

- А) вскрыть ожоговые пузыри;
- Б) охладить обожженную часть тела прохладной водой (комнатной температуры) не менее 20 минут;
- В) при отсутствии воды ее можно заменить приложением холода поверх повязки или ткани;
- Г) нанести на пораженный участок мазь.

**8. Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, в первую очередь необходимо:**

- А) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;
- Б) вызвать экстренные службы;
- В) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего;
- Г) позвать помощника.

**9. Какое положение лучше придать пострадавшему с подозрением на травму живота и таза?**

- А) устойчивое боковое положение;
- Б) лежа на спине с приподнятыми ногами, под которые подкладываются сумки или одежда;
- В) лежа на спине с полусогнутыми ногами, сведенными в районе коленных и голеностопных суставов. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.
- Г) лежа на спине с полусогнутыми и разведенными ногами. Под колени подкладывается импровизированная опора – сумка, свернутая одежда.

**10. Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:**

- А) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет;
- Б) запрокинуть голову, попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение его грудной клетки;
- В) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки или перышко;
- Г) положить руку на грудную клетку пострадавшему.